

Pentukuolleisuus

- ▶ Kun minkinpennut syntyy siinä tulee aina menetyksiä. Eli jos naaras on liian lihava niin ei välttämättä hoida kaikkia pentuja tai jos naaras liian laiha. Kuntoluokka tärkeää. Nuoret naaraat myös hävittää enemmän pentuja kuin vanhat. Tarha kierretään aamusta joka päivä läpi ja jos näkyy pentuja verkolla tai pesässä ettei emo hoida niin laitetaan kuivauskaappiin lämpenemään. Tämän jälkeen pennut siirretään toiselle emälle joka on vanha naaras jolla on 4–6 pentua.

- ▶ Kun penikoinnit on ohi pentukuolleisuus on yleensä pientä. Tarha kierretään joka päivä läpi ennen ruokintaa ja katsotaan että kaikki on kunnossa ja että emät syö hyvin. Pentuja aloitetaan yleensä laskemaan toukokuun 18 päivä ja silloin nähdään paremmin kuinka pennut on lähteneet kehittymään ja jos ilmenee ettei emä ole hoitanut pentuja hyvin voidaan siirtää toiselle emälle. Myös yli 8 pentueet tasataan niin että siirretään toiselle emälle ja samaten emät joilla on vain yksi pentu siirretään toiselle.

- ▶ Märkäpennut ei ole ollut ongelma moneen vuoteen. Uskon että tähän vaikuttaa se että emät ovat sopivassa kuntoluokassa ja ruokinta on onnistunut. Rehua nostetaan penikoinnin jälkeen joka päivä maltillisesti ja ruokintaan käytetään aikaa. Myös hyvä rehuhygieniä on tärkeää eli meidän tarhalla on rehuvarasto jossa on kylmäkone joka on säädetty + 4 asteeseen. Siilo pestään päivittäin ja trukki pidetään puhtaana. Myös pentuverkot pyritään pitämään puhtaana.

- ▶ Jos märkäpentuja ilmenee niitä hoidetaan antibiootilla esimerkiksi Amovet, emälle annetaan 1 ml ja pennuille myös n. 0,2 ml ja kuivikkeet vaihdetaan samalla uusiin. Jos märkäpentuja ilmenee paljon ei aika yleensä millään riitä kaikkien hoitamiseen ja tällöin antibiootti kuuri rehun mukana on järkevin vaihtoehto.


- ▶ Kesäkuun alusta lähtien pentuja joilla ongelmia siirretään pentusairaalaan. Yleensä ongelmat alkaa tarhalla kesäkuun toisella viikolla. Imetysanemiaa alkaa esiintyä emillä joilla paljon pentuja ja pentu menetyksiä tulee puremien takia. Purennat johtuu siitä ettei pennut ole vielä oppineet juomaan vettä ja syömään kunnolla rehua. Emät joutuu tällä aikaa koville. Purenta aika kestää yleensä noin viikon ja tällöin rehuun lisätään B vitamiiniä lisää ja rehuun lisätään vettä jotta pentujen olisi helpompi syödä sitä.

- ▶ Imetysanemiaa esiintyy juhannukseen asti ja tarvittaessa emille annetaan suolaliuosta 30 millia pistoksena. Myös rehuun jolla emät ruokitaan lisätään kasvirasvaa imetysanemian vähentämiseksi kesäkuun alusta alkaen. Meidän tarhalla on käytössä juomakupit jotka asennetaan nipan alle, tämä helpottaa pentujen juomaan oppimista. Myös paine lasketaan alhaalle juoma automaateissa. Rokotukset tehdään juhannuksen jälkeen ja pentujen erottelu aloitetaan heinäkuun alussa. Kun pennut ovat paikoillaan kuolleisuus on yleensä ollut hyvin pientä koko kesän ja vasta syksyllä se on kohonnut.

Pentusairaala

- ▶ Pentusairaalaan kerätään pennut joilla ongelmia
 - Huonosti kehittyneet pennut
 - Puremat
 - Emä kuollut imetysanemiaan, pennut sairaalaan
- ▶ Helpompi hoitaa pentuja kun kaikki samassa paikkaa, säästyy aikaa hoidossa kun ei tarvitse kiertää koko tarhaa

- ▶ Sairaala koostuu 4 laatikosta ja yhteen laatikkoon menee noin 15 pentua
 - Jokaisen laatikon yläpuolella on lämpölamppu
- ▶ Pennut voidaan siirtää sairaalaan kun ovat noin 28 vuorokautta vanhoja
- ▶ Pentuja pidetään sairaalassa 3–7 vuorokautta
- ▶ Sitä mukaa kun pennut kehittyvät niin sairaalaa tyhjennetään eli isoimmat pennut viedään tarhalle 6 pentua/häkki

- ▶ Ruokinta tehdään aamulla ja illalla
 - Rehu tehdään lieväksi ja sekoitetaan vasikanmaitojauhetta rehuun
 - Tarvittaessa antibioottia rehun mukaan esimerkiksi Linkomixiä
 - ▶ Vedet vaihdetaan päivittäin
 - ▶ Pidetään muutenkin siistinä sairaala
- 

- ▶ Sairaala ollut käytössä 3 vuotta. Tällä hetkellä 2 yksikköä
 - ▶ Sairaalan kautta kulkenut vuosittain noin 500 pentua
 - ▶ Hyvä hankinta, pystynyt pelastamaan pentuja ja aikaa säästynyt pentujen hoidoissa
- 